

## Acuda al Servicio de Urgencias



Si presenta alguno de estos signos o síntomas:



- Fiebre superior a 38° C.



- Dolor intenso.

## Teléfonos de interés

### Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Atención al ciudadano	951 032 248
	951 032 020
	951 032 663
Centralita	951 032 000
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 032 394
Admisión de urgencias	951 032 391
Fax	951 032 022

### Hospital Marítimo de Torremolinos

Atención al ciudadano	951 033 713
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 033 711
	951 033 712
Fax	951 033 705

### Centro de especialidades San José Obrero

Atención al ciudadano	951 034 000
	951 034 021
	951 034 031
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 034 005
Fax	951 034 035

Documento aprobado por la Comisión de Calidad  
"Educación para la Salud"  
Fecha de última revisión: 15/05/2012

Hospital Universitario Virgen de la Victoria  
Campus Universitario Teatinos, s/n  
29010 - Málaga - España  
951 032 000 / Fax 951 032 022  
<http://www.huw.es>



## Hospital Universitario Virgen de la Victoria



## Recomendaciones para pacientes con procedimiento quirúrgico de Miringotomía

Unidad de Gestión Clínica Bloque Quirúrgico


## ¿Qué es la Miringotomía?

Es una técnica quirúrgica que consiste en realizar, bajo visión microscópica, una pequeña incisión en el tímpano para conseguir airear el oído medio y extraer la secreción que pueda existir en él.



## Drenaje

A veces se coloca un pequeño drenaje (DTT) para evitar que esta incisión se cierre.



La mejoría de la audición suele ser inmediata tras la expulsión del líquido desde el oído.

## Tras la intervención

Pueden aparecer pequeñas molestias, tales como:

- Dolor leve.
- Pequeñas secreciones de aspecto mucoso o sanguinolento.

## Cuidados que debe seguir

Es conveniente que siga los siguientes cuidados:



- Reposo domiciliario las primeras 24 horas tras la intervención.



- No se moje la cabeza ni el oído hasta recibir autorización médica. Es aconsejable el uso de gorro de baño.

## Otros cuidados

- Es importante que no realice movimientos bruscos con la cabeza.



- Tome la medicación recomendada por su médico.

