

## Acuda al Servicio de Urgencias



Si presenta alguno de estos signos o síntomas:



- Fiebre superior a 38° C.



- Dolor intenso que no cede a los analgésicos pautados.
- Vértigo intenso con vómitos y/o zumbidos intensos que no desaparecen con el tratamiento indicado.

Recuerde que estamos a su disposición para asesorarle en cuantas dudas pudieran plantearsele.

## Teléfonos de interés

### Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Atención al ciudadano	951 032 248
	951 032 020
	951 032 663
Centralita	951 032 000
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 032 394
Admisión de urgencias	951 032 391
Fax	951 032 022

### Hospital Marítimo de Torremolinos

Atención al ciudadano	951 033 713
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 033 711
	951 033 712
Fax	951 033 705

### Centro de especialidades San José Obrero

Atención al ciudadano	951 034 000
	951 034 021
	951 034 031
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 034 005
Fax	951 034 035

Documento aprobado por la Comisión de Calidad  
"Educación para la Salud"  
Fecha de última revisión: 15/05/2012

Hospital Universitario Virgen de la Victoria  
Campus Universitario Teatinos, s/n  
29010 - Málaga - España  
951 032 000 / Fax 951 032 022  
<http://www.huw.es>



## Hospital Universitario Virgen de la Victoria



## Recomendaciones para pacientes con Laberintectomía

Unidad de Gestión Clínica Bloque Quirúrgico

## ¿Qué es la Laberintectomía Química?

Es un procedimiento que consiste en inyectar una sustancia química, Gentamicina, a través de una pequeña incisión en la membrana del tímpano.



Este procedimiento tiene como fin el conseguir la anulación parcial o total de la función vestibular

## ¿Por qué se realiza este procedimiento?

El tratamiento del síndrome vertiginoso se hace normalmente con medicamentos. Cuando este tratamiento no consigue mejorar el estado del paciente, se precisa de un tratamiento alternativo, la laberintectomía química.

Existe la posibilidad de que durante la cirugía sea necesario realizar modificaciones al procedimiento, en función de los hallazgos intraoperatorios, para proporcionar un tratamiento más adecuado.

## Tras la intervención

Pueden aparecer pequeñas molestias, tales como:

- Inestabilidad leve o moderada.
- Zumbidos.
- Dolor leve.



## Cuidados que debe seguir tras el alta

Es conveniente que siga los siguientes cuidados:



- Permanezca en reposo domiciliario los tres primeros días y evite realizar esfuerzos físicos tales como levantar peso.
- Realice movimientos suaves, sobre todo al acostarse y levantarse.

## Precauciones

- No conduzca ni manipule maquinaria peligrosa hasta que sea lo autorice su médico.



- Evite los ambientes ruidosos los primeros días tras la intervención.



- No se moje el oído ni la cabeza hasta que se lo indique su médico.
- No ingiera bebidas alcohólicas los tres primeros días.



- Siga una dieta blanda y ligera.