

Vida sexual

La reanudación dependerá de cada paciente y del proceso de cicatrización, por ello es importante acudir a las citas de control.

En general, se recomienda esperar un periodo de entre 6-8 semanas.



Deberá consultar con su médico si nota algunos de los siguientes síntomas:

- Fiebre.
- Sangre en la orina o dificultad para orinar.
- Somnolencia, náuseas o vómitos.
- Escalofríos, tos o si se siente débil y con dolores.
- Si tiene problemas con el funcionamiento de su implante.
- Dolor o inflamación del pene o del escroto que no ceda con la medicación prescrita.
- Hinchazón, enrojecimiento, dolor o secreción en/alrededor de la herida quirúrgica.

Si le surgieran otras dudas, no dude en preguntar a su enfermero/a toda la información que precise, ellos se la proporcionarán.

Teléfonos de interés

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Atención al ciudadano	951 032 248 951 032 020 951 032 663
Centralita	951 032 000
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 032 394
Admisión de urgencias	951 032 391
Fax	951 032 022

Hospital Marítimo de Torremolinos

Atención al ciudadano	951 033 713
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 033 711 951 033 712
Fax	951 033 705

Centro de especialidades San José Obrero

Atención al ciudadano	951 034 000 951 034 021 951 034 031
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 034 005
Fax	951 034 035

Documento aprobado por la Comisión de Calidad
"Educación para la Salud"
Fecha de última revisión: 08/02/2012

Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Campus Universitario Teatinos, s/n
29010 - Málaga - España
951 032 000 / Fax 951 032 022
<http://www.huw.es>



Hospital Universitario Virgen de la Victoria




Recomendaciones al alta tras intervención quirúrgica de prótesis de pene

UGC Cirugía Mayor Ambulatoria

La Prótesis

La implantación quirúrgica de una prótesis de pene es un tipo de cirugía destinado a tratar la disfunción eréctil (DE) o impotencia.

La prótesis de pene es un dispositivo que consta de tres partes: dos cilindros que se introducen a lo largo del pene mediante una incisión en la línea media de la base del mismo, cerca de la unión pene-escrotal y conectados, por un lado, a un reservorio de solución salina (cerca de la vejiga) y, por otro, a una bomba hidráulica colocada dentro de la bolsa escrotal.



Para conseguir la erección, usted debe presionar la bomba alojada en el escroto mediante dos toques para conseguir que el líquido pase del reservorio a los cilindros directamente y consiga que el pene consiga un estado rígido. Esta erección, durará hasta que usted vuelva a presionar otra vez la bomba hidráulica para que la solución salina vuelva al reservorio.

Una vez intervenido, deberá de llevar a cabo unas sencillas instrucciones en casa, para un pronto y adecuado restablecimiento.

Recomendaciones

En general, al ser una cirugía poco agresiva, el alta es dada a las 12-24 horas tras la intervención.

- En las primeras 24 horas deberá guardar reposo.
- A partir del segundo día, ya puede caminar.



- No deje de tomar el tratamiento prescrito por su médico.
- Lave con agua y jabón la zona, secando minuciosamente y manteniendo seca la herida quirúrgica. Debe aplicar diariamente un antiséptico y una gasa sobre ésta.
- Evite el estreñimiento, tome una dieta rica en fibra (frutas, verduras, etc.) y beba un litro y medio de agua (si no tiene contraindicación).
- Evite llevar ropa apretada.
- Es aconsejable no sentarse sobre el escroto durante la primera semana para no empujar la bomba hacia arriba. Puede utilizar un suspensorio o soporte escrotal.

Otras recomendaciones

- La mayoría de los pacientes restablece su ritmo de vida normal entre la primera y segunda semana tras la intervención, evitando levantar peso, realizar ejercicios, grandes esfuerzos o actividad laboral.



- La prótesis, se deja en estado de semierección; debe de llevar el pene erecto hacia el ombligo, para facilitar el drenaje linfático y disminuir la inflamación.
- No manipule la bomba hidráulica alojada en el escroto hasta que su médico le instruya en el manejo de la misma.
- No deje de asistir a las citas de control con su médico.
- El aprendizaje del manejo de la prótesis activas se comienza una vez que ha cesado el dolor espontáneo (normalmente entre 7-10 días). Con cada paciente se realizarán varias sesiones de aprendizaje.