


## Otras recomendaciones

Se recomienda no tome antiinflamatorios como la aspirina por lo menos una semana después de la intervención, ya que pueden incrementar el riesgo de sangrado.



Si tiene otras dudas solicite a su enfermero/a toda la información que precise, él se la proporcionará.



El equipo del Servicio de Cirugía General Ambulatoria del Hospital le desea una pronta recuperación, esperando que estas recomendaciones le sean útiles y fáciles de aplicar tras haber sido intervenido.

## Teléfonos de interés

### Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Atención al ciudadano	951 032 248
	951 032 020
	951 032 663
Centralita	951 032 000
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 032 394
Admisión de urgencias	951 032 391
Fax	951 032 022

### Hospital Marítimo de Torremolinos

Atención al ciudadano	951 033 713
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 033 711
	951 033 712
Fax	951 033 705

### Centro de especialidades San José Obrero

Atención al ciudadano	951 034 000
	951 034 021
	951 034 031
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 034 005
Fax	951 034 035

Documento aprobado por la Comisión de Calidad  
"Educación para la Salud"  
Fecha de última revisión: 04/10/2011

Hospital Universitario Virgen de la Victoria  
Campus Universitario Teatinos, s/n  
29010 - Málaga - España  
951 032 000 / Fax 951 032 022  
<http://www.huw.es>



## Hospital Universitario Virgen de la Victoria




## Recomendaciones al alta en Intervención de vasectomía

Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Mayor Ambulatoria

## La intervención

A continuación, vamos a darle algunos consejos que pueden ayudarle a prevenir complicaciones cuando usted se vaya de alta.

Usted ha sido intervenido de Vasectomía, intervención consistente en la sección y ligadura de los conductos deferentes.



Su objetivo es el control natal y tras la intervención y en poco tiempo el semen eyaculado no contendrá espermatozoides.



Deberá llevar a cabo unas sencillas instrucciones en casa, para un pronto y adecuado restablecimiento.

## Recomendaciones

1. Cura diaria de la herida quirúrgica con una solución antiséptica. Los puntos de sutura se desprenderán por sí solos, aproximadamente en unos 45 días, sin necesidad de retirarlos.

2. Tras la intervención deberá permanecer los dos primeros en reposo.



3. Durante la semana siguiente a la intervención quirúrgica no deberá tener relaciones sexuales y sostendrá los testículos con unos slips apretados o con un suspensorio.



4. Use el método anticonceptivo habitual, hasta transcurridos alrededor de tres meses desde la intervención o tras veinte eyaculaciones.



Durante este tiempo piense que aún es fértil porque pueden quedar espermatozoides en los conductos seminales.

Deberá acudir a su médico de familia al objeto de que le solicite un espermiograma de control y así confirmar la eficacia del método.



5. Tenga en cuenta que esta prueba podrá repetirse tantas veces como sea necesario, hasta que no se detecten espermatozoides.